

四、胆囊癌

一、胆囊息肉

(一)

癌前病变：腺瘤、

不癌变：胆固醇息肉、炎性息肉（多发性增生）

(二) 胆囊息肉癌变的危险因素

- 1、>1cm VS >2cm 结石易癌变
- 2、单发
- 3、基底部宽大、逐渐增大
- 4、合并胆囊结石、胆囊壁增厚

(三) 治疗

- 1、无症状+无危险因素：6-12个月B超随访观察
- 2、否则LC——术中快速切片病检——若发现恶变——根据情况决定是否肝切除/清扫淋巴结

二、胆囊癌

(一) 好发部位：底、体部（面积大，结石堆积） VS 胆囊穿孔好发：底颈部

(二) 类型：主要是腺癌 VS 食管癌：鳞癌（Barrett食管/化生-腺癌）；胃肠胰腺胆管胆管：腺癌；肝癌：肝细胞癌；阑尾癌：类癌

(三) 体征：隐匿，所以恶性度高、预后差

- 1、常在晚期触及肿大胆囊
- 2、不伴感染无发热
- 3、不伴胆管梗阻、无黄疸、无转氨酶升高
- 4、放化疗大多无效

(四) 分期：TNM

胆囊壁：黏膜层、肌层、浆膜层

消化道：黏膜层（黏膜上皮层、固有层、黏膜肌层）、黏膜下层、肌层、浆膜层

